

ZOOSERINE®

ORNI

ANTI-INFECCIOSO POLIVALENTE

Os quimioterápicos que entram na composição do **ZOOSERINE®** possuem diferentes mecanismos de acção, têm efeito bacteriostático e actuam de forma sinérgica ou aditiva. Associações antimicrobianas deste tipo previnem o aparecimento de resistências cruzadas ou de grupo e minimizam os riscos de toxicidade, quando são utilizadas no tratamento de infecções mistas causadas por agentes etiológicos que não são susceptíveis a um antibacteriano comum.

DENOMINAÇÃO E COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO PRODUTO EM SUBSTÂNCIAS ACTIVAS

Tetraciclina cloridrato.....	90,0 mg/g
Cloranfenicol.....	66,5 mg/g
Furazolidona.....	15,0 mg/g

INDICAÇÕES PRINCIPAIS

O **ZOOSERINE®** está indicado no tratamento de infecções mistas do aparelho respiratório e do tracto digestivo. As infecções respiratórias crónicas, traqueobronquites, pneumonia, micoplasmose e tuberculose e as gastroenterites causadas por salmonelas e por *Escherichia coli*, bem como a clamidiose, estão entre as principais indicações. As enterobacteriáceas Gram- são agentes patogénicos comuns das aves canoras e ornamentais e dos pombos, ainda que muitas vezes sejam considerados invasores oportunistas.

As doenças bacterianas mais comuns nas aves de companhia são causadas por *E.coli*, *Klebsiella*, *Pseudomonas* e *Chlamidia psittaci*. Menos comuns são as causadas por outras enterobactérias (*Salmonella*, *Citrobacter*, *Proteus* e *Serratia*).

Infecções também importantes mas infrequentes são as causadas por *Bordetella*, *Mycobacteria*, *Megabacteria* e *Pasteurella multocida*.

CONTRA-INDICAÇÕES E EFEITOS SECUNDÁRIOS

Não administrar a animais com hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes, com insuficiência hepática ou doença renal crónica.

A utilização de doses muito elevadas por períodos prolongados pode ter efeitos indesejáveis e provocar reacções adversas e toxicidade. Podem ocorrer sobreinfecções por microrganismos não susceptíveis, como é o caso dos fungos.

As Tetraciclinas em doses terapêuticas, administradas PO, são bem toleradas pelas aves de companhia. A administração prolongada pode originar distúrbios gastrointestinais, hepatotoxicidade e hipovitaminose, sobretudo do complexo B. Após o tratamento deve administrar-se vitaminas do complexo B (no entanto, a sua administração não deve fazer-se durante o tratamento, dado que a riboflavina neutraliza a acção antimicrobiana das Tetraciclinas).

O Cloranfenicol raramente provoca efeitos adversos e reacções tóxicas nos animais. Nos recém-nascidos, dado que a absorção PO é muito elevada e a excreção urinária muito lenta, podem ocorrer situações de depressão, regurgitação, diarreia e desidratação.

A Furazolidona parece não produzir efeitos colaterais nas espécies-alvo.

Doses elevadas, administradas com frequência, podem provocar sobreinfecções, diarreias, vómitos e debilidade geral. Os sintomas desaparecem com a interrupção do tratamento; administrar fluidos e vitaminas do complexo B.

ANTI-INFECCIOSO POLIVALENTE

DOSES DE APLICAÇÃO E MODO DE EMPREGO


Posologia:

- Exóticos (Mandarins, Diamantes, etc.) e outras aves de peso idêntico: ½ comprimido de 12 em 12 horas.
- Canários e Indígenas ou Fauna Europeia de peso idêntico: 1 comprimido de 12 em 12 horas.
- Periquitos Ondulados e Agapornis: 2 comprimidos de 12 em 12 horas.
- Caturras e outros Psitacídeos de peso idêntico: 2 a 3 comprimidos de 12 em 12 horas.

Os comprimidos devem ser administrados durante 3 dias seguidos no mínimo e 6 no máximo.

Modo de administração:

1. Introduzir o comprimido no aplicador incluso.
2. Agarrar a ave com uma das mãos e com a unha do polegar entreabrir-lhe o bico.
3. Com a outra mão, introduzir a extremidade do aplicador na cavidade oral da ave, sobre a base da língua.
4. Premir o êmbolo para depositar o comprimido dentro da garganta.
5. Manter o bico da ave fechado durante alguns segundos e, ao mesmo tempo, massajar-lhe a garganta, de modo a facilitar a deglutição.



ADVERTÊNCIAS AO UTILIZADOR

Não administrar a outras espécies animais para além das indicadas.

A eliminação do produto não utilizado ou os seus desperdícios devem acautelar a contaminação de cursos e outras fontes de água.

Não administrar durante a postura.

NÃO UTILIZAR APÓS A DATA DE VALIDADE INSCRITA NA EMBALAGEM.

Conservar a temperatura inferior a 25° C. Manter a embalagem bem fechada, num lugar seco e fresco, ao abrigo da luz solar.

Manter afastado do alcance e da vista das crianças.

Não administrar a animais produtores de alimentos para o consumo humano.

Devido à fotossensibilização induzida pelas Tetraciclina, deve ser evitada a exposição das aves à luz solar durante o período de tratamento.

Em caso de acidente, contactar o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS: Telefone 808 250 143.

Restringir o aporte de cálcio na fase de tratamento.

As pessoas com hipersensibilidade aos seus constituintes devem evitar o contacto com o produto. Não inalar. Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Em caso de contacto, lavar cuidadosamente as zonas afectadas com água corrente e sabão.

Denominação social e domicílio da empresa responsável pelo fabrico e da empresa responsável pela introdução no mercado

Fabricante: GUFARMA, Lda. (Nº 4/FPUV/2003-DGV) – Oliveira de Frades (Portugal).

R.I.M.:



AVIZOON, Lda
R. 1º de Dezembro, 1 – 2625-451 FORTE DA CASA – PORTUGAL
Telef. 21 956 79 16/7 – Fax 21 956 79 15
geral@avizoon.pt – www.avizoon.pt

AV nº 010/00/08PUVPT